

GRANDE PHYLLORINE

Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823)

Fiche n°35

Date de la 1ère observation : 10/09/2014

Lieux d'observation : Rimba (baie de Muaro Duo) - Sumatra Ouest - Indonésie

Méthodes d'identification : Capture, photos

NOMS

Nom commun international : Intermediate Roundleaf Bat, Horsfield's Leaf-nosed Bat, Intermediate Leaf-nosed Bat.

Synonymes : -

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Asie du Sud et du Sud-est

Bangladesh, Inde, Sud Chine et île de Hainan, Laos, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Malaisie (péninsule et Bornéo), Indonésie (Mentawai, Sumatra, Java, Bali et Kalimantan).

HABITAT

Divers habitats, depuis les terres agricoles jusqu'aux forêts tropicales primaires et secondaires, dans les zones sèches et humides jusqu'à 1480 m d'altitude. Généralement dans les grottes calcaires mais aussi dans les mines abandonnées, les crevasses rocheuses, les pagodes jusque dans les habitations humaines. Un perchoir peut contenir plusieurs centaines de chauves-souris des deux sexes et peut être partagé avec d'autres espèces.



MAMMIFERE TERRESTRE



Famille des Hipposidérinés
(chauves-souris à feuille nasale arrondie)

STATUTS

Statut IUCN : Préoccupation mineure (2008)

CITES-2017 : -

Informations complémentaires : -

CLASSIFICATION

EMBRANCHEMENT	Chordata
SOUS-EMBRANCHEMENT	Vertebrata
CLASSE	Mammalia
ORDRE	Chiroptera
FAMILLE	Hipposideridae
GENRE	Hipposideros
ESPECE	larvatus

DESCRIPTION

Taille : 5,1-6,7 cm (avant-bras), 3,2-3,5 cm (queue), 2,1-2,5 cm (oreille)

Poids : 15-23 g

Écholocation : 97-100kHz (péninsule malaise), 86-102kHz (Laos)

Clé d'identification : de taille moyenne avec 3 folioles latérales de chaque côté du nez. Parties supérieures brun-gris foncé à brun rougeâtre. Parties inférieures légèrement plus pâles. Nez, oreilles et membrane des ailes brun.

NOTES TAXONOMIQUES

Des études récentes indiquent qu'il s'agit d'un complexe de plusieurs espèces avec des variations géographiques considérables en termes de taille, de fréquence d'écholocation et de génétique. Des études plus approfondies seraient nécessaires pour affiner la classification.

ALIMENTATION

Essentiellement des coléoptères. Mange aussi des papillons, des mouches, des moustiques, des termites, des insectes de l'ordre des hémiptères, des fourmis, des guêpes, des araignées, des acariens et des tiques.

MENACES

Pas de menace majeure. Chassée localement.

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Charles M. Francis, 2008, **A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF SOUTH-EAST ASIA**, ed. New Holland Publishers (UK) Ltd, 392p.

Bates P., Bumrungsri S., Suyanto A., Molur S. & Srinivasulu C. 2008. *Hipposideros larvatus*. The **IUCN Red List of Threatened Species 2008**: e.T10143A3173793.

La page sur *Hipposideros larvatus* sur le site des parcs nationaux en Thaïlande : **Thai National Parks**

La page sur *Hipposideros larvatus* dans la base de données Encyclopedia of Life : **EOL**

A PROPOS DE CETTE FICHE

Statut : Confirmée

Date de publication : 27/02/2017

Dernière modification : -

Numéro de référence : 35

Lien permanent :

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-35/>

EQUIPE DE REDACTION

Rédacteur principal : Nadège Lanau

Correcteur : -

Observateur : Emmanuel Cosson

Crédit photo : Emmanuel Cosson

Comment citer cette fiche ?

LANAU Nadège, COSSON Emmanuel
in : **RIMBA**, 27/02/2017 : *Hipposideros larvatus* Horsfield, 1823,
<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-35/>

