

ROUSSETTE DE MALAISIE

Pteropus vampyrus (Linnaeus, 1758)

Pteropus vampyrus ssp. sumatrensis (Ludeking, 1862)

Fiche n°39

Date de la 1ère observation : 01/2016

Lieux d'observation : Rimba (baie de Muaro Duo) -
Sumatra Ouest - Indonésie

Méthodes d'identification : Photos, visuel

NOMS

Nom commun international : Large Flying Fox.

Synonymes : Kalong de Malaisie, Grand Renard volant.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Asie du Sud et du Sud-est : *Pteropus vampyrus*

Sud Myanmar, Sud Vietnam, Sud Chine, Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei, Malaisie (péninsule et Bornéo) et surtout en Indonésie (Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Timor, Kalimantan...).

Indonésie : *Pteropus v. sumatrensis*

Sumatra

HABITAT

Tolérante aux perturbations modérées de l'habitat. Forêts primaires et secondaires et mangroves. Utilise des zones agricoles adjacentes pour l'alimentation. Plus répandu dans les régions côtières, se rencontre aussi jusqu'à 1 370 mètres d'altitude. Niche dans les grands arbres avec des branches supérieures sans feuilles, ou



MAMMIFERE TERRESTRE



Famille des Ptéropodidés
(chauves-souris frugivores)

STATUTS

Statut IUCN : Quasi menacée (2008)
pour l'espèce *P. vampyrus*.
Sous-espèces non évaluées.

CITES-2017 : Annexe II (commerce
réglementé)

Informations complémentaires :
Population en diminution. Chasse
interdite en Thaïlande et au
Cambodge mais difficilement
contrôlable.

CLASSIFICATION

EMBRANCHEMENT	Chordata
SOUS-EMBRANCHEMENT	Vertebrata
CLASSE	Mammalia
ORDRE	Chiroptera
FAMILLE	Pteropodidae
GENRE	Pteropus
ESPECE	vampyrus

dans les cocoteraies et les vergers.

DESCRIPTION

Taille : 18,5-20 cm (avant-bras), 0 cm (queue), 1,5 m (envergure)

Poids : 0,6-1,1 kg

Clé d'identification : Une des plus grandes chauves-souris du monde. Caractéristiques faciales de renard. Poils sur les parties inférieures long et laineux, poils du dos plus courts et plus raides (plus prononcé chez les mâles). Arrière du dos habituellement noir avec des stries grises, nettement séparé du manteau brun-orange jusqu'à l'arrière de la tête. Côtés de la tête et de l'avant du cou mélangés brun-rougeâtre et noir, se fondant dans la partie ventrale brun-noir. Immatures uniforme terne gris-brun. Longues oreilles pointues, absence de queue.

ALIMENTATION

Frugivore : consomme des fruits (ramboutan, figes, langsat, mangues, bananes), du nectar et des fleurs (noix de coco et durian). Important pollinisateur.

MENACES

Principalement le braconnage surtout en Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Philippines, pour la viande et pour le sport. Considéré comme un ravageur agricole, il est tué en conséquence. Perte de l'habitat.

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Charles M. Francis, 2008, **A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF SOUTH-EAST ASIA**, ed. New Holland Publishers (UK) Ltd, 392p.

Bates P., Francis C., Gumal M., Bumrungsri S., Walston J., Heaney L. & Mildenstein T. 2008. *Pteropus vampyrus*. The **IUCN Red List of Threatened Species 2008**: e.T18766A8593657.

A PROPOS DE CETTE FICHE

Statut : Confirmée - photo manquante

Date de publication : 01/03/2017

Dernière modification : -

Numéro de référence : 39

Lien permanent :

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-39/>

EQUIPE DE REDACTION

Rédacteur principal : Nadège Lanau

Correcteur : -

Observateur : Nadège Lanau

Crédit photo : © Masahiro Iijima / www.ardea.com - Arkive

Comment citer cette fiche ?

LANAU Nadège in : **RIMBA**,

01/03/2017 : *Pteropus vampyrus* ssp. *sumatrensis* Ludeking, 1862,

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-39/>

La page sur *Pteropus vampyrus* dans la base de données
Encyclopedia of Life : [**EOL**](#)

La page sur *Pteropus vampyrus* dans la base de données
photographiques : [**ARKive**](#)

La page de *Pteropus vampyrus* sur le site de référence
Animal Diversity Web : [**ADW**](#)

La page sur *Pteropus vampyrus* sur le site des parc
nationaux en Thaïlande : [**Thai National Parks**](#)