

CIVETTE MALAISE

Viverra tangalunga (Gray, 1832)

Fiche n°29

Date de la 1ère observation : 2015

Lieux d'observation : Rimba (baie de Muaro Duo) -
Sumatra Ouest - Indonésie

Méthodes d'identification : Visuel

NOMS

Nom commun international : Malay Civet, Malayan Civet,
Oriental Civet.

Synonymes : -

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Asie du Sud-Est

Indonésie : Sumatra et Kalimantan (introduite aux Molluques et à Sulawesi), Malaisie : Péninsule, Sabah, Sarawak et Philippines (introduction confirmée ; espèce native non confirmée).

HABITAT

Nocturne. Grande variété d'habitats incluant les forêts primaires et secondaires, les terres cultivées et la périphérie des villages. Restent sous couvert forestier le jour et peuvent en sortir la nuit. Principalement terrestres, bien qu'elles puissent grimper facilement les arbres si nécessaire. Commune jusqu'à 1100 m d'altitude, beaucoup plus rare entre 1100-2100 m d'altitude. Tolérance à des perturbations modérées de l'habitat.



MAMMIFERE TERRESTRE



Famille des Viverridés
(civettes)

STATUTS

Statut IUCN : Préoccupation mineure (2016).

CITES-2017 : -

Informations complémentaires :
population stable. Espèce
partiellement protégée en Malaisie et
en Indonésie.

CLASSIFICATION

EMBRANCHEMENT	Chordata
SOUS-EMBRANCHEMENT	Vertebrata
CLASSE	Mammalia
ORDRE	Carnivora
FAMILLE	Viverridae
GENRE	Viverra
ESPECE	tangalunga

DESCRIPTION

Taille : 61-67 cm (tête-corps), 28-36 cm (queue)

Poids : 4-5 kg

Clé d'identification : Parties supérieures grisâtres avec de nombreuses taches noires. Une bande noire le long de la ligne médiane s'étend des épaules jusqu'à l'extrémité de la queue. Habituellement 3 colliers noirs et 2 blancs de la gorge aux côtés du cou. Parties inférieures blanches. Pattes noires. Environ 15 bandes noires transversales sur la queue.

ALIMENTATION

Omnivore à préférence carnivore : petits mammifères, oiseaux, serpents, grenouilles et insectes. Ils Mangent aussi des œufs, des fruits, des racines.

MENACES

En tant qu'espèce vivant au sol, exposée au pièges, à la chasse avec des chiens et aux chiens errants. Empoisonnement dans les plantations de palmiers à huile en mangeant des rats empoisonnés. Parfois chassée pour la nourriture. Considérée par l'Homme comme un ravageur (attaque de volailles). Perte de l'habitat, surtout les forêts de plaine.

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Charles M. Francis, 2008, **A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF SOUTH-EAST ASIA**, ed. New Holland Publishers (UK) Ltd, 392p.

Duckworth J.W., Mathai J., Wilting A., Holden J., Hearn A. & Ross J. 2016. *Viverra zangalunga*. The **IUCN Red List of Threatened Species 2016**: e.T41708A45220284.

La page de *Viverra zangalunga* sur le site de référence Animal Diversity Web : **ADW**

La page sur *Viverra zangalunga* sur le site des parcs nationaux en Thaïlande : **Thai National Parks**

A PROPOS DE CETTE FICHE

Statut : Confirmée - Photo manquante

Date de publication : 25/02/2017

Dernière modification : -

Numéro de référence : 29

Lien permanent :

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-29/>

EQUIPE DE REDACTION

Rédacteur principal : Nadège Lanau

Correcteur : -

Observateur : Nadège Lanau

Crédit photo : © Nick Garbutt / naturepl.com - ARKive

Comment citer cette fiche ?

LANAU Nadège in : **RIMBA**,

25/02/2017 : *Viverra zangalunga*

Gray, 1832,

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-29/>

